

**Tabella 3. Stima dei DALYs\*, mortalità e prevalenza delle principali malattie tropicali dimenticate\*\***

|   | <b>DALYs*<br/>(in milioni di anni)</b> | <b>Mortalità'</b> | <b>Prevalenza stimata<br/>in milioni di persone</b> |
|---|--|-------------------|---|
| <b>Malattie ad alta prevalenza</b>  |  |                   |   |
| Anchilostomiasi   | 1,8-22,1                               | 3.000-65.000      | 600   |
| Ascariidiasi  | 1,2-10,5                               | 3.000-60.000      | 800   |
| Trichuriasi   | 1,6-6,4                                | 3.000-10.000      | 600   |
| Filariosi linfatica   | 5,8                                    | <500              | 120   |
| Schistosomiasi  | 1,7-4,5                                | 15.000-280.000    | 200   |
| Tracoma   | 2,3                                    | <500              | 84  |
| Oncocerciasi  | 0,5                                    | <500              | 37  |
| Lebbra  | 0,2                                    | 132.000           | 0,2   |
| <b>Malattie virali o protozoarie</b>  |  |                   |   |
| Febbre dengue   | 0,7                                    | 19.000            | 50  |
| Leishmaniosi  | 2,1                                    | 51.000            | 12  |
| Morbo di Chagas   | 0,7                                    | 14.000            | 8-9   |
| Tripanosomiasi Africana   | 1,5                                    | 48.000            | <0,1  |
| *DALYs: <i>Disability-adjusted life-years</i> (anni di vita persi a causa di disabilità o della morte prematura dovuta ad una malattia) |  |                   |   |

\*\* Liese B, Rosenberg M, Schratz A. Programme, partnership, and governance for elimination and control of neglected tropical diseases. *The Lancet* 2010; 375:67-76.